| Linzer biol. Beitr. 35/1 . 669-670 30.6.2003 | Linzer biol. Beitr. | 35/1 | 669-670 | 30.6.2003 |
|--|---------------------|------|---------|-----------|
|--|---------------------|------|---------|-----------|

Das bisher unbekannte Männchen von Microphadnus insperatus PRIESNER 1967 (Hymenoptera, Pompilidae)

H. WOLF

Microphadnus insperatus PRIESNER 1967

Microphadnus insperatus PRIESNER 1967: 57, Q. Locus typicus: Türkei: Antakya. Holotypus in coll. Schwarz; geprüft.

Von der Wegwespen-Gattung Microphadnus sind nur die beiden Arten M. insperatus PRIESNER 1967 Q und M. pumilus (COSTA 1882) Q & bekannt. Letztere Art ist rund ums Mittelmeer, vom Nahen Osten bis Zentralasien verbreitet und nicht selten (WOLF 1990: 641); M. insperatus war nur als Q und nur aus Anatolien bekannt. Die Unterscheidung der Q Q der 2 Arten findet man bei WOLF 1990: 624.

Frau Lisa Standfuss, D-Dortmund, hatte nach jahrelangen Feldbegehungen das Glück, außer M. pumilus Q & und M. insperatus Q das bisher unbekannte & letzterer Art, alle an gleichem, engbegrenzten Fundort, zu finden. Es befindet sich in meiner Sammlung und ist wie folgt etikettiert: (Platania/Volos, GR, 2.9.2002, leg. Lisa Standfuss) (Microphadnus insperatus PR., &, det. L. Standfuss 2002).

| M. insperatus さ | M. pumilus さ | | |
|---|--|--|--|
| Metanotum mitten : Metapostnotum mitten = 7 : 5, dieses nach hinten halb- kreisförmig | Metanotum mitten: Metapostnotum mitten = 7:2, Metapostnotum überall gleich breit | | |
| Vordere Tergite undeutlich gerötet | diese nicht gerötet | | |
| 2. und 3. Tergit am Ende seitlich mit kleinen hellen Tomentflecken | dort mit breiten hellen Tomentbinden | | |
| Toment überwiegend hellbraun | Toment überwiegend hellgrau | | |
| Größe 3,0 mm | Größe 3,5 – 4,5 mm | | |

Der Lecto-Holotypus M. $pumilus \ Q$ wurde geprüft. Es ist anzunehmen, dass auch M. insperatus ein Schneckenhaus-Bewohner oder Bezieher verlassener Aculeaten-Erdnester ist wie M. pumilus.

Zusammenfassung

Beschreibung des bisher unbekannten & von Microphadnus insperatus PRIESNER.

670

Literatur

PRIESNER H. (1967): Zur Kenntnis der Pompiliden (Hymenoptera) der Türkei. — Sber. öst. Akad. Wiss. I 176: 45-60. Wien.

WOLF H. (1990): Zur Kenntnis der Wegwespen-Gattung *Gonaporus* ASHMEAD 1902 und verwandter Gattungen (Hym., Pompilidae). — Linzer biol. Beitr. 22: 619-716. Linz.

Anschrift des Verfassers: Heinrich WOLF, StDir. i.R.

Uhlandstraße 15

D-58840 Plettenberg, Deutschland